



ISTITUTO COMPRENSIVO CASORIA3-CARDUCCI-KING
Via S.M.C. Brando -80026 Casoria (Na)
via A. Moro – 80026 Casoria (NA)
Tel e Fax 081 7586601



ISTITUTO COMPRENSIVO
"CASORIA 3 - CARDUCCI-KING"
CASORIA (NA)
Prot. 0009671 del 20/11/2025
VII (Uscita)

A tutti i docenti
Al DSGA
Al sito web

CIRCOLARE 49 DEL 20.11.2025

OGGETTO :INFORMATIVA DA PARTE DEL COMUNE

In seguito a comunicazione da parte del comune si informa l'utenza tutta che:

In alcune scuole sono stati segnalati, in via INFORMALE, casi di ossiuriasi.

Si ritiene opportuno, in via precauzionale, fornire le seguenti indicazioni:

Per i collaboratori scolastici

Tenere la carta igienica in un cassetto e non alla portata di tutti; dare a ciascun bambino la carta necessaria evitando che questa possa essere toccata da tutti i bambini che si recano ai servizi igienici;

Invitare tutti i bambini che si recano ai servizi igienici a lavarsi accuratamente le mani.

Disinfettare accuratamente i servizi igienici compreso gli scarichi dopo ogni utilizzo.

Disinfettare accuratamente giocattoli e materiali didattici quotidianamente.

Per i docenti

Ricordare agli alunni l'importanza del lavaggio accurato delle mani dopo essersi recati in bagno, nonché prima e dopo i pasti.

Per i genitori

Provvedere ad una accurata igiene come misura di prevenzione; rivolgersi al pediatra nel caso di avvenuto contagio; spiegare ai bambini cosa sono i vermi intestinali, le precauzioni da prendere per evitare di contagiarsi e le cose da fare se si dovesse essere contagiati; comunicare tempestivamente alla scuola l'insorgenza di eventuali casi per i provvedimenti ulteriori.

In allegato, a titolo di prevenzione, si riporta SCHEDA INFORMATIVA circa la profilassi da eseguire.

Si ringrazia per la collaborazione.

SCHEDA INFORMATIVA: INFESTAZIONE DA OSSIURI

L'ossiuriasi è la più frequente infestazione intestinale, provocata dagli ossiuri, piccolissimi vermi a forma di spillo.

La prevalenza è particolarmente elevata nei bambini in età scolare e prescolare.

Ha decorso ed esito benigno, che in genere non comporta rischi per il soggetto infestato.

Come si trasmette

La trasmissione avviene principalmente per via oro-fecale: le uova sono trasportate attraverso le mani e le dita ed attraverso gli oggetti contaminati come giocattoli, lenzuola, biancheria, copri- sedili di wc.

Come si manifesta

Il sintomo più frequente è il prurito anale, prevalentemente notturno, che può causare irritabilità ed insonnia, ma spesso è asintomatica. Raramente si possono verificare infezioni batteriche su lesioni da grattamento.

Cosa occorre fare se si verifica un caso di malattia

La ricerca degli ossiuri 'è indicata nei soggetti sintomatici e viene effettuata con lo scotch test, per la ricerca al microscopio delle uova.

Il trattamento è previsto solo per i soggetti infestati e, in questo caso, va esteso a tutti i familiari. Per la terapia farmacologica è bene rivolgersi al pediatra di libera scelta ed al medico di medicina generale.

Prevenzione del contagio

Un corretto comportamento di igiene personale è il mezzo più efficace per prevenire il contagio o la reinfezione nei soggetti già interessati dalla malattia:

Si elencano di seguito le misure da adottare sia a scuola che a casa per evitare l'intestazione da ossiuri:

- La misura di prevenzione più importante ed efficace è il lavaggio accurato e frequente delle mani con acqua calda e sapone, da effettuarsi soprattutto prima di mangiare, prima di preparare o manipolare o servire il cibo, dopo esser stati in bagno, dopo aver cambiato il pannolino ai bambini, dopo aver maneggiato la biancheria.
- Insegnare ai bambini l'importanza di lavarsi le mani per prevenire l'infestazione, vigilando perché questo avvenga.
- Tenere le unghie pulite e molto corte per evitare che possano accumularvisi le uova.
- Evitare di "mangiarsi" le unghie.
- Scoraggiare l'abitudine di grattare l'area perianale per evitare il raccogliere ed il disperdersi delle uova.
- Nel caso in cui una persona sia infestata dagli ossiuri è necessario assumere la terapia specifica secondo le indicazioni del medico curante, importante inoltre, il cambio giornaliero ed il lavaggio a caldo in lavatrice ad almeno 60°C delle lenzuola e della biancheria intima, tenuto conto che le uova sopravvivono per quasi un mese.

- Cambiare frequentemente biancheria intima, lenzuola ed asciugamani, lavandole ad una temperatura di almeno 60°C. In caso di ossiuriasi accertata, anche lenzuola ed asciugamani andranno cambiate quotidianamente per almeno due settimane dopo l'inizio della terapia.
- Gli ambienti domestici e quelli comunitari vanno puliti eliminando la polvere, adottando tutti gli accorgimenti volti a prevenire la contaminazione delle superfici da uova di parassiti e la loro successiva dispersione nell'ambiente, effettuando una accurata pulizia delle superfici. In particolare, va effettuata accurata igiene ambientale quotidiana dei locali e delle superfici sia a scuola che a casa con detergenti e disinfettanti, seguita da abbondante risciacquo (con particolare attenzione per i sanitari, la rubinetteria, le maniglie delle porte). Si consiglia di utilizzare quotidianamente l'aspirapolvere per circa un mese per eliminare gli accumuli di polvere che potrebbero contenere le uova degli ossiuri (soprattutto nelle aree sottostanti i tetti e nei bagni, nelle scanalature delle soglie e dei davanzali, nelle aree di soggiorno).
- Praticare accurata igiene del materiale ludico-ricreativo e degli arredi almeno una volta al giorno, o più frequentemente, se visibilmente sporchi: sanificazione con immersione in acqua e detergente a media temperatura, disinfezione con soluzione disinfettante, abbondante risciacquo ed asciugatura. Evitare l'uso di peluche o, se possibile, lavarli ad almeno 60°C.
- Non è necessario l'allontanamento da scuola o da altra collettività.

F.to Il Dirigente Scolastico
 Prof. Giovanni Buonocore
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.L. n.39/1993